CHELODINA LONGICOLLIS.

CHELODINA LONGICOLLIS.

Testâ suprà fuscâ; sterno flavo, suturis nigris.

Testudo longicollis. Shaw, Gen. Zool. III. p. 62. t. 16. Zool. New. Holl. I. p. 19. t. 7.—Schœpff. Hist. Test. p. 135.
Emys longicollis. Schweig. Prod. p. 309. sp. 28.
Hydraspis longicollis. Bell, Zool. Journ. III. p. 512.
Chelodina longicollis. Gray, Syn. p. 39.
Chelodina Novæ Hollandiæ. Bibron, Erpet. II. 443.

Habitat in lacubus et paludosis Australiæ.
Mus. nostr., Mus. Brit.

Descriptio. *Caput* depressum, collo vix latius, suprà glabrum, lateribus squamosis, nigriscenti plumbeum; *nasum* subproductum naribus terminalibus; *oculi* parvi, prominentes, vivaces, iridibus pallidè flavis; *oris rictus* mediocris; *mentum* tuberculis quatuor minutis. *Collum* testam longitudine æquans, cylindricum, rugosum, tuberculatum, flexibile, suprà plumbeo-nigrum, subtùs pallescens, sub margine anteriore testæ, horizontalitèr duplicatum retractile. *Pedes* squamosi, suprà nigricantes, subtùs sordidè flavescentes, digitis singulorum quatuor tantùm unguiculatis, externis muticis. *Cauda* tuberculata, brevis, obtusè conica. *Testa* ovata, margine integro, anticè rotundata, posticè subangulata, subelevata, medio depressa vel subcanaliculata, omninò rugosa, et quasi tuberculata, fusca, suturis nigris. *Scuta* integerrima, sulcis angustis, profundis separata, areolis nullis: *vertebralia* depressa; primum planum, maximum, subpentagonum; secundum, tertium, quartum quadrato-hexagona; quintum pentagonum: *costalia* levitèr convexa, declivia; primum trapezium; secundum et tertium oblonga; quartum subquadratum: *marginalia* declivia, quadrata, integerrima; anteriora et posteriora latiora; intermedia angustissima: *scutum nuchale* quadratum, planum. *Sternum* latissimum, integrum, anticè rotundatum, posticè angulatè emarginatum, alis angustis: *scuta sterni* plana, glabra, flava, suturis nigris; *gularia* transversa, quadrilatera, angusta; *intergulare* magnum, hexagonum, angulo postico